选择性必修二物质结构与性质

第一章 原子的结构与性质
第一节 原子的性质



能

量

4 4f 4d 4p 4s

3 3d 3p 3s

2 2p 2s

1 1s



1 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p
5s 4d 5p; 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d
7s 7p
6s 6p 6d
5s 5p 5d 5f
4s 4p 4d 4f
3s 3p 3d
2s 2p
1s
7
6
5
4
3
2
1

2. 电子排布式：
将能级所填充的电子数标在该能级符号的右上角，并将能层低的能级写在左边，得到的式子为电子排布式。
（1）原理：构造原理
（2）规则：
按能层由低到高
填充顺序与书写顺序有别








Na $1s^22s^22p^63s^1$
K
L
M
Fe $1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$
K
L
M
N



□□□□□□□□□□□□□□□

C □O □Al □P

$_{21}$Sc □$_{25}$Mn □$_{27}$Co □$_{36}$K
r

□□**9**□□**14**□□**23**□□**30**□□**35**□□□□□□□□□□□

[illegible] **P11**



△ [illegible] [illegible] + [illegible]

[illegible] **Na** [illegible] $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ **[Ne]** $3s^1$

[illegible]

[illegible] **Ne** [illegible]

[illegible] **9** [illegible] **14** [illegible] **23** [illegible] **30** [illegible] **35** [illegible]

△：价层电子 元素周期表价层：在化学反应中可能发生电子变动的能级称为价电子层（简称价层）。







1 □□□□□□□□□□ $1s^22s^22p^63s^23p^6$ □□□　　□　　AC

A□Sc^{3+}　B□Mg^{2+}　C□Cl^-　D□Br^-

2 □□□□□□□□□□□□□□　　□　　B

A□Cl^-　　B□$^{37}_{17}Cl$　　C□ (+17) 2 8 8　　D□$1s^22s^22p^63s^23p^6$

3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ $E(nl)$ □□□□□□□□
□□□□□□□　　□　　AB

A□$E(4s)$□$E(3s)$□$E(2s)$□$E(1s)$

B□$E(3d)$□$E(4s)$□$E(3p)$□$E(3s)$

C□$E(5s)$□$E(4f)$□$E(4s)$□$E(3d)$

D□$E(5s)$□$E(4s)$□$E(4f)$□$E(3d)$

4 □□□□□□□□□□ $3s^23p^4$，□□□□□□□□□ ____________

□3□□□□VIA□



激发态与电子跃迁
①电子可以在基态和激发态之间发生电子跃迁，也可以在不同的激发态之间发生电子跃迁
②原子的激发态是电子被激发到较高能级，但尚未失去电子的状态
③同一原子处于激发态时能量一定高于处于基态时的能量 ④电子跃迁一般发生在能量相近的能级间
⑤离子也存在基态和激发态











激光源

夜空中的激光


Li
Na
K
Ca
Sr
Ba
Cu



NEON
汽车之家


1. [illegible] $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3p^2$ [illegible]

[illegible] （ [illegible] ） A

A [illegible]

B [illegible]

C [illegible]

D [illegible]

2. [illegible]

(1) $1s^2 2s^2\ 2p^6 3s^2\ 3p^6 3d^5 4s^2$ [illegible]

(2) $1s^2 2s^2\ 2p^6 3d^1$ [illegible]

2、光谱与光谱分析
（1）光谱：不同元素的原子发生跃迁时会吸收或放出不同的光，可以用光谱仪摄取各种元素的电子吸收光谱或发射光谱，总称原子光谱。
（2）光谱分析：在现代化学中，常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素，称为光谱分析。

锂、氦、汞的发射光谱 锂、氦、汞的吸收光谱
特征:暗背景, 亮线,
线状不连续

特征:亮背景, 暗线,
线状不连续



科学史话：P11

•①“光谱”的提出：牛顿，1672 年 •②“七基色”：“红、橙、黄、绿、青、蓝、紫”
•③1859年，德国科学家本生和基尔霍夫发明了光谱仪，摄取了当时已知元素的光谱图
•④1913年，丹麦科学家波尔建立了量子力学



①

1860 1861

1868

②

656.3 nm

氢气放电管



①

②

③

④

⑤

⑥